



ワクチン	種類	乳児期										幼児期					学童期/思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③							④ (注1)												
肺炎球菌 (PCV13)	不活化			①	②	③							④												(注2)
B型肝炎	ユニバーサル			①	②					③															(注3)
	母子感染予防	①	②							③															
ロタウイルス	1価			①	②					(注4)															
	5価			①	②	③				(注5)															
4種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②	③							④ (注6)												(7.5歳まで)
3種混合 (DPT)	不活化			①	②	③							④ (注6)												(7.5歳まで)
2種混合 (DT)	不活化																								⑤ (注7)
																									⑥11-12歳 (注8)
																									11歳 ①
																									12歳
ポリオ (IPV)	不活化			①	②	③							④ (注6)												(7.5歳まで)
																									⑤ (注9)
BCG	生									①															
麻疹・風疹混合 (MR)	生													①											② (注10)
水痘	生													①			②								(注11)
おたふくかぜ	生													①											② (注12)
日本脳炎	不活化																								① ② ③ (7.5歳まで)
																									④9-12歳
インフルエンザ	不活化																								毎年 (10、11月などに) ①②
																									13歳より①
ヒトパピローマウイルス (HPV)	2価,4価	不活化																							(注13) 小6 中1 ①②③ (注14) 中2~高1 (注15)
	9価	不活化																							(注13) 小6 中1 ①② (注14) 中2~高1 (注15)

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期